

Korai menopauza:

A nők szervezetében megemelkedhet az FSH szint, amely idő előtti menopauzát jelezhet pl.:

- inzulinrezisztencia, azaz magas inzulináramlás esetén (az alacsony progeszteron szintnek köszönhetően),
- korai vagy kornak megfelelő menopausa jellegű tünetek esetén,
- fogamzásgátló (azaz szintetikus szteroid) tabletták szedését vagy GnRH (szintetikus fehérje) kezelést követően,
- endometriózis, mióma, policisztás ovárium szindróma vagy egyéb nőgyógyászati eltérések esetén,
- egyéb hasi, alhasi gyulladásos betegség vagy hasi trauma következtében,
- a petefészek fejlődési rendellenességének esetén,
- petefészek károsodása miatt: pl. kemoterápia, sugárterápia vagy bizonyos gyógyszerek, hormonkészítmények szedését követően,
- bizonyos esetekben alacsony D-vitamin szint esetén,
- a petesejt sejtmagjának minőségi csökkenése esetén (alacsony AMH szint),
- a petefészek daganatos megbetegedései következtében.

A korai menopauzával küzdő hölgyeknél, akikkel találkozom, eredményes a módszerem. A donáció vagy az IVF kezelés nem válik szükségessé, ha megfogadják a tanácsaimat.

Módszerem nemcsak a külső, de a belső visszafiataltást is eredményezheti (egyéni állapottól eltérően).

Alacsony AMH szint önmagában nem indokolja a donációt. Még akkor sem, ha nincs peteérés.

100 %-osan visszafordítható, lényegében akár azonnali spontán terhességgel.

A hormonkészítményekkel nagyon komolyan öregíthetnek a szervezeten, ez korai klimaxnál végzetes lehet, főként akkor, ha alacsony az AMH, vagy csak 20 körüli, alatti az FSH érték.